

Herr / Frau _____

ABBINDUNGSBEHANDLUNG / LIGATUR NACH BARRON


Bei vergrößerten **Hämorrhoiden** oder **Mastdarmvorfall** werden bei Ihnen Abbindungen mit kleinen Gummiringen durchgeführt.

Oft wird die Behandlung mit einer **Verödung der Hämorrhoiden** (Sklerosierung) und/oder Einspritzung mit Sterilöl in das abgebundene Gewebe kombiniert.

Nach einigen Tagen (i.d.R. 2-14 Tage) fällt das abgebundene Gewebe zusammen mit dem Gummiring (meist unbemerkt) ab. Die entstandene innere Wunde verheilt innerhalb von ca. 4 Wochen.

Weitere Abbindungen erfolgen deshalb erst nach min. 6-8 Wochen.

Vorgesehen sind (noch) _____ solcher Abbindungen



Dr. med. Peter Wilhelm, Viszeralchirurg
Dr. med. Bernd Weber, Chirurg, Proktologe
Kompetenzzentrum für Proktologie (BCD e.V.)

Untere Vorstadt 11
D-71063 SINDELFINGEN
Fon+49 (0)7031-873540 Fax+49 (0)7031-873508
Mail kontakt@end-und-dickdarmpraxis.de

RISIKEN & NEBENWIRKUNGEN

1. BLUTUNG: Leichte Blutungen direkt nach der Behandlung und beim Abfallen des abgebandenen Gewebes sind harmlos. Das Risiko einer stärkeren Blutung kann durch die Einnahme von **ASPIRIN® / ASS100 (ACETHYLSALICYLSÄURE)** und anderen blutverdünnenden Medikamenten steigen. **Niedrig dosiertes ASS100 bei Herz- & Gefäßerkrankungen sollte nach Absprache mit dem behandelnden Arzt unbedingt weiter eingenommen werden !**

S E L T E N (Literatur 0.5% - eigene Statistik 1:1000) kann es so bluten, dass eine Blutstillung vorgenommen werden muss.

WIE ÄUSSERT SICH DIES? Sie haben Stuhldrang, aber es entleert sich nur frisches Blut und kein Stuhl. Tritt dies nur einmalig auf, hat die Blutung bereits wieder aufgehört. Bei mehrfachen Blutabgängen im Abstand von 10 -20 min kommen Sie bitte **nach telefonischer Ankündigung unter 07031-873540** direkt in die Praxis. Falls diese nicht mehr besetzt, ist können Sie uns unter folgender Nummer erreichen: **01520 - 1738596**.

Falls Sie uns nicht erreichen können, gehen Sie **unmittelbar in das nächstgelegene Krankenhaus**. Dort werden Sie möglicherweise stationär aufgenommen. Gelegentlich ist eine Blutstillung im Operationssaal erforderlich. Selten kann auch eine Bluttransfusion notwendig werden.

BEWAHREN SIE DIESES MERKBLATT FÜR 3 WOCHEN IM GELDBEUTEL ODER DER HANDTASCHE AUF. DER ARZT IM KRANKENHAUS WEISS DANN, WO DIE BLUTUNGSQUELLE LOKALISIERT IST.

Aus o.g. Gründen machen wir **2-3 Wochen vor einer FERNREISE keine Abbindungen**.

2. SCHMERZ: Oft stellt sich nach der Behandlung ein unangenehmer Druck im After ein (wie Stuhldrang), der selten länger als 12 Stunden anhält. Stärkere Schmerzen treten bei etwa 10% der Patienten auf. Sie können dann Ibuprofen 400-600mg (1 Tbl. alle 8 Stunden) oder Paracetamol 500mg (1-2 Tbl. alle 6 Stunden) einnehmen. Ggf. geben wir Ihnen auch Diclofenac Zäpfchen mit. Die Wahl des Medikaments ist abhängig von Ihren Vorerkrankungen, Allergien oder Unverträglichkeiten. Bitte nehmen Sie **keine** Medikamente ein, die Acetylsalicylsäure enthalten (z.B. Thomapyrin®)

3. ANALTHROMBOSE: Schmerzhaftige Knoten außen am After sind eine seltene Komplikation und klingen meist unter Anwendung einer schmerzlindernden Salbe (z.B. Posterisan akut® - frei verkäuflich) und lokaler Kühlung von alleine ab. Zeigen Sie den Befund ggf. dem behandelnden Arzt.

4. ENTZÜNDUNG: Lokale Entzündungen im Bereich der Abbindungsstelle sind sehr selten. Bei Fieber, Krankheitsgefühl und Schmerzhaftigkeit muss u.U. mit Antibiotika behandelt werden.

DATUM	LOKALISATION IN SSL	SKLEROS.	ÖL-INSTILL.	ARZTKÜRZEL
1)				
2)				
3)				
4)				

Bringen Sie das Merkblatt bitte zu jeder Behandlung mit - - Danke